Iranian Journal of Critical Care Nursing
Vol. 4, No. 2, Summer 2011
Page: 93 – 96

مجله پرستاری مراقبت ویژه
دوره 4، شماره 2، تابستان 1390
صفحات: 96- 93

مطالعه رفتار بهداشتی کردن دست پرستاران در بخش‌های مراقبت ویژه

رقیه نظری [*] MSc، محمود حاجی احمدی [1] MSc، مرضیه داداش‌زاده [2] BSc، پروانه عسگری [2] BSc

*. دانشکده پرستاری مامایی آمل، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
1. مرکز تحقیقات بیماری‌های غیرواگیر کودکان، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران
2. بیمارستان هفده شهریور، آمل، ایران

چکیده

اهداف: نقش دست‌ها، به عنوان عامل مهم انتقال عفونت در بیمارستان‌ها شناخته شده و بهداشتی کردن دست‌ها، نخستین گام توصیه شده برای کنترل عفونت‌ها است. اطلاعات دقیقی در مورد عملکرد پرستاران موجود نیست. این مطالعه با هدف بررسی عملکرد بهداشتی کردن دست انجام شد.

روش‌ها: در این مطالعه رفتار بهداشتی کردن دست پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه در 159 موقعیت بهداشتی کردن دست مورد مشاهده نامحسوس در سال 1388 قرار گرفت و چگونگی رفتار آنان و مشخصات بیمار و رویه انجام شده در چک لیستی که بر اساس دستورالعمل کشوری حفاظت در برابر بیماریها تدوین شده بود، ثبت شد. داده‌ها با آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS17 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها: پرستاران مورد مشاهده در150 موقعیت (94/3 درصد) دستکش پوشیدند؛ اما فقط در 27 موقعیت (16/98 درصد) اقدام به بهداشتی کردن دست‌های خود نمودند. از میانِ موقعیت‌هایی که اقدام به بهداشتی کردن دست‌ها صورت گرفته بود، در بیست مورد (74 درصد) از مایع الکلی و در سایر موارد از آب و صابون و آب ساده استفاده شد. بیشتر موارد بهداشت دست، بعد از تماس با بیمار بوده است. بین نوع دستکش مورد استفاده‌ی پرستاران، خطر انتقال عفونت و رویه مورد مشاهده با بهداشتی کردن دستها، ارتباط معنی داری وجود داشت ($p<0/05$).

نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که درصد موقعیت‌هایی که پرستاران درآن اقدام به بهداشتی کردن دست‌ها نموده‌اند بسیار کمتر از حد انتظار بوده است.

واژگان کلیدی: بهداشتی کردن دست‌ها؛ بخش‌های مراقبت ویژه؛ پرستار؛ عفونت بیمارستانی

Study of hand hygiene behavior among nurses in Critical Care Units

Roghieh Nazari[*] Msc, Mahmood Haji Ahmadi[1] Msc, Marziye Dadashzade[2] BSc, Parvane Asgari[2] BSc

*. Amol Faculty of Nursing and Midwifery, Babol Medical Sciences University, Babol, Iran
1. Children's non Ommunicable Diseases Research Center, Babol Medical Sciences University, Babol, Iran
2. Hefdah Shahrivar Hospital, Amol, Iran

Abstract

Aims: The role of hands is well known as a leading cause of infection transmission in hospitals, and hands hygiene is the first step recommended for infection control. This study was conducted to evaluate hand hygiene behavior among critical care nurses.

Methods: In this study in 2009, hands hygiene behavior was unobviously monitored in 159 hand-sanitizing situations among critical care units nurses, and their behavioral status as well as the patients profile and the performed procedure were recorded in a checklist designed based on national guidelines of disease control and protection. Data were analyzed by SPSS17 statistical software using descriptive analytical tests.

Results: The observed nurses wore glove in 150 situations (94.3 percent); whereas, they attempted to sanitize their hands only in 27 positions (16.98 percent), from which alcohol was used in 20 cases (74 percent), and soap and water and plain water in other situations. Most cases of hand hygiene were following the contact with patients. There was a significant relationship between the glove types used by nurses and infection risk of the observed procedure with hands hygiene ($p <0.05$).

Conclusion: The study findings indicate that percentage of situations in which nurses attempted to sanitize their hands has been much less than expected.

Keywords: Hands hygiene; Critical Care Units; Nurse; Nosocomial infection

*نویسنده مسؤول: رقیه نظری، تمام درخواست‌ها باید به نشانی r.nazari@mubabol.ac.ir فرستاده شوند.
دریافت مقاله: 88/12/10 پذیرش مقاله: 89/7/2

[Downloaded from jccnursing.com on 2026-11-23]

مقدمه

عفونت بیمارستانی یکی از مهم‌ترین مشکلات در بخش‌های مراقبت ویژه است. به‌طوری که بیست درصد بیماران بستری در این بخش‌ها را مبتلا کرده و میزان مرگ و میر را به بیش از سی درصد افـزایش می‌دهد [1]. این عفونت‌ها علاوه بر افزایش مرگ و میر، مدت زمان بستری را نیز طولانی‌تر کرده و بر هزینه‌های درمان می‌افزایـد [2]. بیماران بستری در بخش‌های ویژه به سبب وجود عوامل خطرسازی چـون صـدمات متعـدد، پـایین بـودن سـطح هوشـیاری و ضـعف مکانیسم‌های پیشگیری کننده، بیش از سایر بیماران در معرض خطر عفونت بیمارستانی قرار دارند. ایـن عفونـت‌هـا، مـواردی از عفونـت هستند که 48 ساعت پس از بستری شدن در بیمارستان ایجاد شـده باشد [1]. محققان به خوبی نقش دست‌ها را به عنـوان عامـل مهـم انتقال عفونت در بیمارستان‌ها شـناخته‌انـد [3] و دسـت‌هـای ارایـه دهنـدگان خـدمات سـلامت را یکـی از اصـلی‌تـرین منـابع انتقـال برشمرده‌اند و به همین سبب شستن دست‌ها را به عنوان گام نخست پیشگیری و کنترل عفونت‌های بیمارستانی به همه‌ی ارایه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی توصیه نموده‌اند [4] و تأکید کـرده‌انـد کـه دست‌ها باید قبل و بعد از هر گونه تماس با بیمار و یا تجهیزات، بـه روش بهداشتی و با استفاده از آب و صابون، کلر هگزیدین گلوکنات، ژل الکل یا سایر مواد مجاز، شست‌وشو شوند [6،5]. این کار با از بین بردن میکروارگانیسم‌های کلونیزه در پوست دست‌ها، مؤثرترین روش پیش‌گیری از عفونت‌های بیمارستانی به حساب می‌آید [7]. اهمیـت بهداشتی کردن دست‌ها، پژوهش‌گران زیادی را به مطالعـه واداشـته است و به عنوان یکی از دغدغه‌های مهم کشورهای توسـعه یافتـه، سبب شد تا مطالعات زیادی در این زمینـه در بیشـتر کشـورها، بـه خصوص کشورهای اروپایی و امریکایی به انجام برسد. این مطالعات بیان‌گر این واقعیتند که با وجود سادگی، ارزانـی و راحتـی بهداشـتی کردن دست، اقدام به این کار از سوی مراقبت کنندگان کمتر از حـد انتظار است [5، 8، 9] و با این که بیشـتر مراکـز بهداشـتی درمـانی برنامه‌های وسیعی برای آموزش این رفتار بـه اجـرا مـی‌گذارنـد امـا پذیرش آن از سوی کارکنان کم است [10] از جملـه، مطالعـه‌ای در آمریکا این میزان را 21 درصد اعلام نموده است [5].

پرستاران دلایل گوناگونی برای کمتر شستن دست‌های خود اعـلام می‌کنند. مثل عادت نداشتن، کمبـود آگـاهی، سـهل انگـاری، کـار معمول، کمبود لوازم شست‌وشو و خشک کردن، شلوغی بخـش‌هـا، نامناسب بودن مواد شست‌وشو دهنـده و در آخـر نقـص در سیسـتم مدیریتی [11، 12]. در سال‌های اخیر، قـدم‌هـای مثبـت زیـادی در بیمارستانهای کشور ما برای کاهش عفونت بیمارستانی برداشته شده است. کمیته‌ها و پرستاران کنترل عفونت، ضمن ارایه‌ی آموزش‌ها و دستورالعملهای مدیریتی، تأکید زیادی بر بهداشتی کـردن دسـت‌هـا دارند. لذا لازم به نظر می‌رسد کـه بـا توجـه بـه ایـن توصـیه‌هـا و عملکردهـا و اهمیـت بهداشـتی کـردن دسـت‌هـا بـه خصـوص در بخش‌های ویژه، به بررسی چگونگی رفتار بهداشـتی کـردن دسـت پرستاران بخش ویژه پرداخته شود و این مطالعه با این هدف انجـام شد.

روش‌ها

در این مطالعه توصـیفی- تحلیلـی، رفتـار بهداشـتی کـردن دسـت پرستاران بخش‌های ویژه در 159 موقعیت بهداشتی کـردن دسـت، مورد مشاهده قرار گرفت. مشاهده توسط مشاهده‌گر آموزش دیـده و به صورت نامحسـوس و تصـادفی در سـال 1388 انجـام شـد. هـر موقعیت بهداشتی کردن دست به مواقعی که پرستار قبل و بعد از آن ملزم به بهداشتی کردن دستها می باشد، اطلاق می‌شود؛ مثل تماس با بیمار، دادن دارو، تماس با لوازم و تجهیـزات و... [5]. انجـام ایـن مطالعه پس از موافقت بیمارستان‌ها، هماهنگی لازم با واحد کنتـرل عفونت، که وظیفه آموزش و نظارت بر رفتار بهداشتی کردن دست را بر عهده دارد، صورت گرفت. نتایج مشاهده شامل مشخصات بیمار، نوع روش انجام شده، نحوه بهداشتی کردن دست، نوع ماده به کـار رفته برای بهداشتی کردن، نحوه‌ی خشک کردن دسـت‌هـا پـس از شست‌وشو، وجود ترشح عفونی واضح در بیمار و میزان خطر انتقـال عفونت در چـک لیسـت، ثبـت شـد. ایـن چـک لیسـت بـر اسـاس دستورالعمل کشوری بهداشتی کردن دست تنظیم شـده بـود. البتـه لازم به ذکر است که ما در این مقاله بـه توصـیف رفتـار بهداشـتی کردن دست پرداختیم و قضاوتی در خصوص صـحیح بـودن نحـوه رفتار انجام نداده‌ایم.

همه‌ی پرستاران مشاهده شـده در ایـن مطالعـه، آمـوزش سـمعی و بصری نحوه‌ی بهداشتی کردن دست را گذرانـده بودنـد و امکانـات بهداشـتی کـردن دسـت شـامل سـینک، آب و صـابون مـایع در قسمت‌های مختلف بخش در دسترس بوده و محلول الکل گلیسرینه بالای سر تک‌تک بیماران مهیا بود. دستورالعمل شست‌وشوی دست در کنار سینک‌ها و نحوه‌ی بهداشتی کردن به وسیله مایع الکلـی در بخش‌ها نصب شده بود. داده ها در نرم افزار SPSS17 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای t-test و کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

موقعیت‌های مشاهده شده 159 مورد بود که مربـوط بـه مراقبـت از 101 بیمار مذکر و 58 بیمار مؤنث بـا میـانگین سـن 20/67±44/6 است. جنس 143 پرستار مورد مشاهده (90 درصد) زن بـوده اسـت. مشاهده شوندگان در150 مورد (94/3 درصد) دستکش پوشیدند اما فقط در 27 مورد (16/98 درصد)، اقدام به بهداشتی کردن دست‌های خود نمودند. در موقعیت‌هایی که اقدام به بهداشتی کردن دسـت‌هـا صورت گرفته بود، در بیست مورد (74 درصد) از مایع الکلی، در پنج

[Downloaded from jccnursing.com on 2026-11-23]

مورد (18/5 درصد) از آب و صابون و دو مورد (7/5 درصد) از آب ساده برای بهداشتی کردن دست‌ها استفاده کردند.

دست‌های شسته شده با دستمال یک‌بار مصرف کاغذی خشک شدند و دست‌های بهداشتی شده با مایع الکلی در معرض هوا خشک شدند. جدول 1 تعداد و درصد موقعیت‌هایی که بهداشتی کردن دست‌ها قبل، بعد و هم قبل هم بعد از تماس با بیمار، انجام شده است را با توجه به خطر انتقال عفونت، وجود ترشح عفونی، پوشیدن دستکش و جنس بیمار نشان می‌دهد. این جدول نشان می‌دهد که پرستاران در 83 درصد موقعیت‌ها اقدام به بهداشت دست ننموده‌اند، در پنج درصد قبل از تماس با بیمار، سیزده درصد بعد از تماس و در نه درصد موارد هم قبل و هم بعد از تماس با بیمار، دست‌ها را بهداشتی نمودند.

هم‌چنین ارتباط بین نوع دستکش مورد استفاده پرستاران، خطر انتقال عفونت رویه با بهداشت دست‌ها معنی‌دار بوده است ($p>0/05$)و در سایر موارد از نظر آماری معنی دار نبوده است ($p>0/05$).

بحث

این مطالعه نشان داد که عملکرد پرستاران بخش‌های ویژه در بهداشتی کردن دست‌ها ضعیف بوده است. نتایج پژوهش‌های انجام شده در بخش‌های عمومی، حتی در کشورهای توسعه یافته نیز حاکی از عملکرد ضعیف پرستاران و سایر کارکنان درمانی در بهداشتی کردن دست بوده است [5،13،10]. محققان شلوغی بخش‌ها، عادت کردن به کارهای مرسوم، عدم آگاهی پرستاران، سهل انگاری، در دسترس نبودن وسایل بهداشتی کردن دست‌ها و در نهایت، ضعف مدیریتی را دلایل اقدام کم پرستاران برای بهداشتی کردن دست‌ها ذکر کرده‌اند [12،11]. به همین خاطر در مطالعه‌ی ما برخی از این عوامل مثل عدم دسترسی به لوازم وعدم آگاهی پرستاران، با مهیا بودن لوازم بهداشتی کردن دست‌ها و نیز آموزش وسیع همه پرستاران در این خصوص، کنترل شد. پس باید به جست‌وجو و حل سایر عوامل تأثیر گذار پرداخت.

یافته‌ها نشان داده‌اند که واحدهای پژوهش برای بهداشتی کردن دست‌ها بیشتر از مایع الکلی استفاده نموده‌اند. اما فرستر بیان می‌کند که 89/5 درصد کارکنان شست‌وشو با آب و صابون را به مایع الکلی ترجیح می‌دهند [14].

احتمالاً در دسترس بودن مایع الکلی بالای سر همه‌ی تخت‌ها و راحت‌تر بودن استفاده از آن در مقایسه با آب و صابون و عدم نیاز به لوازم خشک کردن دست‌ها، سبب این امر بوده است. پس با مهیا کردن مایع الکلی با کیفیت، که مورد پذیرش پرستاران باشد، در کنار همه‌ی تخت‌ها و مناطق مورد نیاز، به خصوص شکل جیبی آن، می‌توان موارد بهداشتی کردن دست‌ها را افزود.

در خصوصِ نحوه‌ی خشک کردن دست‌ها، یافته‌ها حاکی از آن است که در موارد بهداشتی کردن دست انجام شده به وسیله‌ی آب و صابون (هرچند تعداد موارد کم بود)، پرستاران دست‌های خود را پس

جدول 1. تعداد و درصد موقعیتهایی که بهداشتی کردن دست‌ها قبل ،بعد و هم قبل هم بعد از تماس با بیمار، با توجه به خطر انتقال عفونت، وجود ترشح عفونی، پوشیدن دستکش و جنس بیمار

متغییر		تعداد موقعیتهای مراقبتی مشاهده شده	بهداشتی کردن دست فقط قبل از مراقبت n (%)	بهداشتی کردن دست فقط بعد از مراقبت n (%)	بهداشتی کردن دست هم قبل و هم بعد از مراقبت n (%)	بهداشتی کردن دست نه قبل و نه بعد از مراقبت n (%)	X^2	p value
کل موقعیتهای مشاهده شده		159	5(3/1)	13(8/2)	9(5/7)	132(83)		
خطر انتقال عفونت	کم	8	0(0)	1(120/5)	1(12/5)	6(75)	14/17	0/028
	متوسط	119	4(3/4)	7(5/9)	3(2/5)	105(88/2)		
	زیاد	32	1(3/1)	5(15/6)	5(15/6)	21(65/7)		
وجود ترشح عفونی	بله	17	1(5/9)	2(11/8)	1(5/9)	13(76/4)	2/25	0/52
	خیر	142	4(2/8)	8(7/7)	8(5/6)	119(83/9)		
پوشیدن دستکش	بدون دستکش	9	0(0)	4(44/4)	1(11/2)	4(44/4)	41/79	0/000
	دستکش پلاستیکی	15	2(13)	3(20)	3(20)	7(47)		
	دستکش لاتکس	84	2(2/4)	2(2/4)	2(2/3)	78(92/8)		
	دستکش استریل	7	1(1/4)	0(0)	0(0)	6(98/6)		
	پلاستیکی + لاتکس	44	0(0)	8(18)	3(6/8)	33(75/2)		
جنس بیمار	مرد	101	3(2/9)	8(7/9)	5(4/9)	85(84/3)	0/267	0/959
	زن	58	2(3/4)	5(8/6)	4(6/9)	47(81/1)		

[Downloaded from jccnursing.com on 2026-11-23]

از شست‌وشو با دستمال کاغذی یک‌بار مصرف خشک کردند. هرچند که در برخی مطالعات تفاوت معنی‌داری بین خشک کردن دست با حوله‌ی پارچه‌ای، خشک‌کن برقی و حوله‌ی کاغذی وجود نداشت، ولی منابع معتبر و سایر محققان، دستمال‌های یک‌بار مصرف را به عنوان بهترین و ایمن‌ترین وسیله‌ی خشک کردن دست‌ها‌معرفی می‌کنند [11]. این کار برای جلوگیری از آلودگی مجدد دست‌ها پس از شست‌وشو لازم است.

نکته‌ی مهم دیگر در همین جدول، شست‌وشوی دست بر اساس نوع دستکش استفاده شده است. با وجود این که پرستاران در بیشتر موارد دستکش پوشیده بودند، ولی در موارد کمی، آن هم بیشتر پس از تماس با بیمار، دست‌های خود را بهداشتی نمودند. این بدان معنی است که آن‌ها به جای سعی در پیش‌گیری و کنترل انتقال عفونت به بیمار، بیشتر به فکر محافظت از خود هستند. البته تحقیقات نشان داده‌اند که حتی اگر آنان این هدف را دنبال نمایند، باز هم دستکش به تنهایی کافی نیست و نمی‌تواند در برابر فلور بیمار از آنان محافظت کند. مطالعات دیگری نیز تأثیر دستکش را بر بهداشتی کردن دست بیان نمودند. برخی موافق با یافته‌ی ما، دستکش پوشیدن را سبب کاهش موارد شست‌وشو و برخی دیگر سبب افزایش آن دانسته‌اند [11].

نگاهی دیگر به همین جدول نشان می‌دهد که با افزایش خطر انتقال عفونت و وجود ترشح عفونی موارد بهداشتی کردن دست، به خصوص پس از تماس، افزایش داشته است که این موضوع دور از انتظار نبوده و با هدف محافظت از خود، تطابق دارد.

نتیجه گیری

یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که درصد موقعیت‌هایی که پرستاران درآن اقدام به بهداشتی کردن دست‌ها نموده‌اند بسیار کمتر از حد انتظار بوده است. با توجه به این که خطر عفونت بیمارستانی برای بیماران بستری در این بخش‌ها بالقوه بیشتر است، لازم است تا مسؤلان و دست اندر کاران با بازنگری و تغییر برنامه‌های آموزشی و بخصوص نظارتی، قدم مثبتی در بهبود این رفتار بردارند. به محققان و علاقه‌مندان نیز پیش‌نهاد می‌شود تا مطالعاتی را به منظور ریشه-یابی علل و یافتن راه حل‌های عملی برای ارتقای رفتار بهداشتی کردن دست طراحی نمایند.

تشکر و قدردانی

محققان مراتب تشکر خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی بابل و مسؤولان محترم کنترل عفونت بیمارستان‌های منتخب اعلام می‌دارند.

References

1. Orsi GB, Scorzolini L, Franchi C, Mondillo V, Rosa G, Venditti M. Hospital – acquired infection surveillance in a neurosurgical intensive care unit. J Hosp Infect. 2006 Sep;64(1):23-9.
2. Ajalloeyan M, Kazemi H, Samar G, Fazzade A. Rate and effective factor of infection in ICU of Khatamolanbia Hospital. J Goum. 2007;2(22):34-38. [Persian]
3. Parsi D, Mirrezaee SM. Infection control Basic concepts and training. Shiraz: Motargem; 2006. P. 53. [Persian]
4. Fuller C, Besser S, Cookson BD, Fragaszy E, Gardiner J, McAteer J, et al. Technical note: Assessment of blinding of hand hygiene observers in randomized controlled trials of hand hygiene interventions. J Infect Control. 2010May;38(4): 332-4.
5. Jenner EA, Fletcher BC, Watson P, Jones FA, Miller L, Scott GM. Discrepancy between self-reported and observed hand hygiene behavior in healthcare professionals. J Hosp Infect. 2006Aug;63(4):418-22.
6. Gaonkar TA, Geraldo I, Shintre M, Modak SM. In vivo efficacy of an alcohol-based surgical hand disinfectant containing a synergistic combination of ethylhexylglycerin and preservatives. J Hosp Infect. 2006Aug;63(4):412-7.
7. Ott M, French R. Hand hygiene compliance among health care staff and student nurses in a mental health setting. Issuses Ment Health Nurs. 2009Nov;30(11):702-4.
8. Creedon SA. Healthcare workers´ hand decontamination practices: Compliance with recommended guidelines. J Adv Nurs. 2005Aug;51(3):208-16.
9. Akyol AD. Hand hygiene among nurses in turkey: Opinions and practices. J Clin Nurs. 2007Mar;16(3):431-7.
10. Tibballs J. Teaching hospital medical staff to hand wash. Med J Aust. 1996 Aprl;164(7):395-8.
11. Akyol A, Ulusoy H, Ozen I. Hand washing: A simple, economical and effective method for preventing nosocomial infection in intensive care units. J Hosp Infect. 2006 Apr;62(4):395-405.
12. Bilski B, Kosinski B. An analysis of selected hands hygiene habits in selected population of nursing staff. Med Pr. 2007;58(4):291-7.
13. Venkatesh A, Lankford MG, Rooney D, Blachford T, Watts C, Noskin G. Use of electronic alerts to enhance hand hygiene compliance and decrease transmission of vancomycin-resistant. Am J Infect Control. 2008 Apr;36(3):199-205.
14. Forrester LA, Bryce EA, Mediaa AK. Clean Hands for Life™: Results of a large, multicentre, multifaceted, social marketing hand-hygiene campaign. J Hosp Infect. 2010Mar;74(3): 225-31.

[Downloaded from jccnursing.com on 2026-11-23]